

CULTIVO DE BERENJENA EN INVERNADERO

Estamos en fechas de poder iniciar siembras de berenjena para su cultivo en invernadero, cuyas plantaciones se realizarán aproximadamente a mediados de febrero, ya que en esta época el semillero requiere entre 70-80 días para que la planta esté lista para el trasplante.



Foto 1.- Planta lista para trasplante.



Foto 2.- Campo recién trasplantado.

Llegado el momento de la plantación será conveniente instalar un sistema de semiforzado, acolchado con polietileno negro y microtúnel, cuya cubierta puede ser un polietileno transparente o polipropileno no tejido, que colocaremos sobre una estructura que puede ser montada ayudándonos de arcos metálicos.

Se recomienda una densidad de plantación aproximada de 1 planta por metro cuadrado. Un marco de plantación ejemplo sería de 2 m entre hileras y 0,5 m entre plantas.



Foto 3.- Sistema de semiforzado.



Foto 4.- Plantación en producción.

Berenjena negra de longitud intermedia

Es la predominante comercialmente y sobre la que las firmas comerciales han centrado la mejora genética, encontrando en el mercado un gran número de variedades híbridas, adaptadas a condiciones de cultivo en invernadero y cultivo al aire libre, así como variedades entre las que se dan diferencias de tamaño del fruto, destinadas al consumo fresco para asar o de menor tamaño para freír.

Dentro de este grupo han destacado en los ensayos realizados en el Centro de Experimentación de Fundación Ruralcaja variedades como Cristal, Monarca y Shakira.



Fotos 5, 6 y 7.- Variedades de berenjena negra intermedia.

Berenjena listada

En Valencia se cultiva la berenjena listada, muy apreciada por el consumidor, con variedades seleccionadas por los propios agricultores y que dan nombre a su origen, pudiendo encontrar la listada de Xeraco, de Gandía, de Xàtiva, de Foios, etc. Este tipo de selecciones estándar tienen que ser tratadas de manera diferente en cuanto al riego en las primeras fases de desarrollo del cultivo, ya que hay que restringirlo hasta que se produce el cuajado de las primeras bayas, para que la planta no genere un vigor excesivo y se produzca el aborto de flores.




Foto 8.- Flor de berenjena



Foto 9.- Plantación con buen vigor.

El Huerto de Fundación Ruralcaja

En la actualidad ya han aparecido algunas variedades híbridas, aunque por el momento no mejoran la producción ni la calidad de las selecciones del terreno, aunque sí mejoran la precocidad.



Foto 10.- Variedad de berenjena listada híbrida.

Dentro del material ensayado en el Centro de Experimentación de Fundación Ruralcaja han destacado algunas selecciones de listada de Gandía y de Pinedo.



Fotos 11, 12 y 13.- Selecciones de berenjena listada del terreno.